

Belangrijke informatie in noodgeval

Patiëntenpas

**Tranylcypromine Milstein 10 mg
omhulde tabletten**

**Het is belangrijk dat u deze kaart altijd
bij u draagt.**

**Laat deze kaart zien aan uw arts,
apotheker, tandarts en alle andere
medische zorgverleners waar u onder
behandeling bent.**

Informatie voor beroepsoefenaars in de gezondheidszorg.

De patiënt die deze kaart bij zich heeft wordt behandeld met Tranylcypromine en loopt het risico op hypertensieve crisis.

Patiëntinformatie

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Indicatie:

Dosis:

Overige geneesmiddelen/ aandoeningen:

In noodgeval waarschuwen

Naam van de arts:

Tel. arts:

Overige:

Naam:

Tel:

Informatie voor de patiënt

Uw arts heeft u Tranylcypromine voorgeschreven. Deze waarschuwingskaart heeft belangrijke informatie voor u.

-Gebruik Tranylcypromine altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

-Stop niet met het innemen van tranylcypromine zonder overleg met uw arts.

-Verander niet de voorgeschreven dosis.

-Meet regelmatig uw bloeddruk. Er is een tabel beschikbaar voor het bijhouden van uw bloeddrukmetingen.

-Meld direct de verschijnselen van een hypertensieve crisis, zoals acuut optredende hevige hoofdpijn, hartkloppingen, pijnlijke stijve nek, regelmatig overslaan van het hart, vaak met pijn onder het borstbeen, transpireren, bleekheid, soms gevolgd door opvliegers, pupilverwijding en lichtschuwheid.

Indien dit u overkomt dient u direct uw arts te raadplegen.

Overige informatie

Tranylcypromine is een monoamine oxidase (MAO) remmer dat helpt tegen ernstige depressieve klachten wanneer behandeling met andere antidepressiva niet geholpen heeft.

Gebruik niet in combinatie met:

-antidepressiva (citalopram, escitalopram, fluvoxamine, fluoxetine, paraxetine, sertraline, venlafaxine, duloxetine, clomipramine, imipramine, amitriptyline, desipramine, nortriptyline, protriptyline, fenelzine en buspiron.

-anti-migraine middelen (tryptanen)

-sympathomimetica

Interacties met andere geneesmiddelen

De volgende geneesmiddelen kunnen in combinatie met tranylcypromine serotoninesyndroom veroorzaken:

- andere MAO-remmers (moclomebide)
- andere geneesmiddelen voor depressie o.a. tricyclische antidepressiva, lithium, SNRI's en SSRI's en tryptofan
- antipsychotica
- linezolid
- sibutramine
- geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige pijn o.a. tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidine, pentazocine en methadon.
- dextromethorfan
- methyleenblauw

Dieetadvies

Wanneer u tranylcypromine tegelijkertijd gebruikt met tyramine bevattend voedsel en/of bepaalde dranken kan een plotselinge stijging van de bloeddruk voorkomen. Dit heet een hypertensieve crisis.

Daarom is een regelmatige meting van de bloeddruk belangrijk.

Vermijd de volgende tyraminerijke voedingsmiddelen:

- beleggen en oude kazen
- oude, gefermenteerde, rauwe, schimmel of gerookte kaas en kaasproducten
- rauw of gerookt vlees/worst en vis
- ongepasteuriseerde melk
- gistproducten
- sommige wijnen en alcoholische dranken of bier

Zie de voedingsadviezenfolder voor de volledige informatie.

www.milstein.nl

RA0110